

Az május 2.-i gyakorlat feladatai

- 1.) Legyenek ξ_1 és ξ_2 független exponenciális eloszlású valószínűségi változók, azaz legyen sűrűségfüggvényük $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ha $x \geq 0$, és $f(x) = 0$, ha $x < 0$. Számítsuk ki $\xi_1 + \xi_2$ sűrűségfüggvényét.

Általánosabban, legyenek ξ_1, \dots, ξ_m független exponenciális eloszlású valószínűségi változók $\lambda > 0$ paraméterrel. Számítsuk ki $\xi_1 + \dots + \xi_m$ sűrűségfüggvényét.

Megoldás: Ki kell számolnunk az $f * f(x)$ illetve $\underbrace{f * \dots * f(x)}_{m\text{-szer}}$ konvolúciókat a fenti

$f(x)$ sűrűségfüggvénnyel. Mivel $f(x) = 0$, ha $x \leq 0$, a konvolúciót meghatározó integrálban szereplő $f(y)f(x-y)$ integrandus nulla, ha $y \leq 0$ vagy $x-y \leq 0$. Innen a konvolúciót definiáló integrál csak $x \geq 0$ esetén lehet nulla, az $x \leq 0$ esetben $f(y)f(x-y) > 0$ minden y -ra nulla, és $x \geq 0$ esetén az $f(y)f(x-y) > 0$ integrandus csak $0 \leq y \leq x$ esetén nem nulla. Innen a $\xi_1 + \xi_2$ valószínűségi változó sűrűségfüggvénye $f_2(x) = f * f(x)$ $x < 0$ -ra $f_2(x) = 0$, és

$$\begin{aligned} f_2(x) = f * f(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y)f(x-y) dy = \int_0^x \lambda e^{-\lambda y} \lambda e^{-\lambda(x-y)} dy \\ &= \int_0^x \lambda^2 e^{-\lambda x} dy = \lambda^2 x e^{-\lambda x}, \quad \text{ha } x \geq 0. \end{aligned}$$

Hasonlóan, ha $f_m(x) = \underbrace{f * \dots * f(x)}_{m\text{-szer}}$ jelöli $\xi_1 + \dots + \xi_m$ sűrűségfüggvényét, akkor

$f_m(x) = 0$ minden $m \geq 1$ számra, ha $x < 0$. Azt állítjuk, hogy $f_m(x) = \frac{\lambda^m x^{m-1}}{(m-1)!} e^{-\lambda x}$, ha $x \geq 0$. Ezen állítás bizonyításához elég belátni teljes indukcióval azt, hogy $f_{m-1} * f(x) = f_m(x)$ a fent definiált f_m függvényekkel. Viszont

$$\begin{aligned} f_{m-1} * f(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{m-1}(y)f(x-y) dy = \int_0^x \lambda^{m-1} \frac{y^{m-2}}{(m-2)!} \lambda e^{-\lambda y} e^{-\lambda(x-y)} dy \\ &= \lambda^m e^{-\lambda x} \int_0^x \frac{y^{m-2}}{(m-2)!} dy = e^{-\lambda x} \frac{\lambda^m x^{m-1}}{(m-1)!}, \quad \text{ha } x \geq 0. \end{aligned}$$

Másrészt $f_m(x) = 0$, ha $x \leq 0$.

- 2.) Legyen ξ és η két független valószínűségi változó, mind a kettő $f(x) = \frac{1}{2}e^{-x}$, $-\infty < x < \infty$, sűrűségfüggvénnyel. Lássuk be először, hogy $f(x)$ valóban sűrűségfüggvény. Számítsuk ki a $\xi + \eta$ valószínűségi változó $g(x)$ sűrűségfüggvényét.

Megoldás: Az $f(x)$ függvény minden pontban nem negatív. Annak ellenőrzéséhez, hogy $f(x)$ sűrűségfüggvény azt kell megmutatnunk, hogy $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$. Viszont hogy $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 e^x dx + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-x} dx = \frac{1}{2} [e^x]_{-\infty}^0 + \frac{1}{2} [-e^{-x}]_0^{\infty} = 1$.

A $\xi + \eta$ valószínűségi változó $g(x)$ sűrűségfüggvényét a $g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)f(x-y) dy$ formula segítségével számíthatjuk ki. Számítsuk ki ezt az integrált. Tekintsük először azt az esetet, amikor $x \geq 0$. Az integrált számítsuk ki úgy, hogy nézzük mind a négy (elvileg) lehetséges esetet, amikor a) $y \geq 0$ és $x-y \geq 0$, b) $y \geq 0$ és

$x - y < 0$, c) $y < 0$, $x - y \geq 0$, d) $y < 0$, $x - y < 0$. Számítsuk ki mind a négy esetben azt, hogy milyen tartományban veszi fel értékét az y változó, és mi az integrandus illetve az integrál értéke ebben a tartományban. Az a) esetben $0 \leq y \leq x$, az integrandus $f(y)f(x - y) = \frac{1}{4}e^{-y}e^{-(x-y)} = \frac{e^{-x}}{4}$, az integrál pedig $\frac{xe^{-x}}{4}$ az a) tartományban. A b) esetben $y > x$ és $f(y)f(x - y) = \frac{e^{-y}e^{x-y}}{4} = \frac{e^{x-2y}}{4}$ az integrál pedig $\frac{1}{4} \int_x^\infty e^{x-2y} dy = \frac{e^{-x}}{8}$, a c) esetben $y < 0$ és $f(y)f(x - y) = \frac{1}{4}e^y e^{-(x-y)} = \frac{e^{2y-x}}{4}$, az integrál pedig $\frac{1}{4} \int_{-\infty}^0 e^{2y-x} dy = \frac{e^{-x}}{8}$, a d) eset nem lehetséges, mert ekkor egyrészt az $y < 0$ másrészt az $y > x \geq 0$ feltételeknek kellene teljesülniük. Innen azt kapjuk, hogy $g(x) = \frac{(x+1)e^{-x}}{4}$, ha $x > 0$. Mivel f szimmetrikus függvény, ezért mint nem nehéz megmutatni, $f(x)$ is az. Tehát $g(-x) = g(x)$, és $g(x) = \frac{(|x|+1)e^{-|x|}}{4}$.

- 3.) Legyenek ξ és η független valószínűségi változók $f(x)$ és $g(x)$ sűrűségfüggvénnyel. Mutassuk meg, hogy $\xi - \eta$ sűrűségfüggvénye a $h(x) = \int_{-\infty}^\infty f(x+y)g(y) dy$ függvény. Értsük meg e formula szemléletes tartalmát is.

Megoldás Legyen $\bar{\eta} = -\eta$. Ekkor $\bar{\eta}$ sűrűségfüggvénye $g(-x)$, ξ és $\bar{\eta}$ függetlenek és $\xi - \eta = \xi + \bar{\eta}$. Innen $\xi - \eta$ sűrűségfüggvénye $h(x) = \int_{-\infty}^\infty f(x - y)g(-y) dy$, és elvégezve az $\bar{y} = -y$ helyettesítést az integrálban megkapjuk a kívánt állítást.

Szemléletes (nem precíz) magyarázat: Annak valószínűsége, hogy a $\xi - \eta$ valószínűségi változó az $[x, x + dx]$ intervallumba esik $h(x) dx$. Ez úgy következhet be, hogy az a ξ valószínűségi változó valamely $x + y$ értéket vesz fel, az η pedig az $[y, y + dx]$ intervallumba esik aminek valószínűsége $f(x + y)g(y) dx$, az y pedig tetszőleges, azaz e változóra összegezni, illetve folytonos értékű lévén integrálni kell. Ez azt jelenti, hogy $h(x) dx = (\int f(x + y)g(y) dy) dx$. Hasonló módon megmagyarázható a konvolúció formula is.)

- 4.) Ha a ξ valószínűségi változó sűrűségfüggvénye $f(x)$, akkor az $\eta = a\xi + b$ valószínűségi változó sűrűségfüggvénye, $a > 0$ $g(x) = \frac{1}{a}f\left(\frac{x-b}{a}\right)$.

Megoldás: Jelölje $F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$ a ξ valószínűségi változó eloszlásfüggvényét. Ekkor η eloszlásfüggvénye $G(x) = P(\eta < x) = P(a\xi + b < x) = P\left(\xi < \frac{x-b}{a}\right)$, sűrűségfüggvénye pedig $g(x) = \frac{dG(x)}{dx} = \frac{d}{dx}F\left(\frac{x-b}{a}\right) = \frac{1}{a}f\left(\frac{x-b}{a}\right)$.

- 5.) Két botot véletlenszerűen, egyenletes eloszlással eltörünk. A két rövidebb darabot összeragasztjuk. Mi az így kapott új bot hosszának az $F(u)$ eloszlásfüggvénye?

Negoldás: Jelölje ξ_j , $j = 1, 2$, azt a valószínűségi változót, amely azt adja meg, hogy a j -ik bot rövidebb végének mi a hossza. Ekkor ξ_1 , és ξ_2 független valószínűségi változók, melyek sűrűségfüggvénye az az $f(\cdot)$ függvény, amelyre $f(x) = 2$, ha $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$, és $f(x) = 0$ egyébként. Minket a $\xi_1 + \xi_2$ valószínűségi változó eloszlása érdekel. Viszont $\xi_1 + \xi_2$ sűrűségfüggvénye $g(x) = f * f(x)$, ahonnan $g(x) = 2 - |2 - 4x|$, ha $0 \leq x \leq 1$, $g(x) = 0$ különben. Ezt kiintegrálva megkapjuk az eredményt, amelyet a a következő képletek adnak meg: $F(u) = 0$, ha $u \leq 0$, $F(u) = 1 - 2u^2$, ha $0 \leq u \leq \frac{1}{2}$, $F(u) = 1 - 2(1 - u)^2 = 4u - 2u^2 - 1$, ha $\frac{1}{2} \leq u \leq 1$. Ha $u \geq 1$, akkor $F(u) = 1$.

- 6.) Két ember 8 és 9 óra között megjelenik egy téren egymástól függetlenül és egyenletes eloszlással. Mind a kettő félórát vár a másikra, és ha az addig nem jön, akkor

hazamegy. Mi a valószínűsége annak, hogy találkoznak?

Megoldás: Jelölje ξ_j , $j = 1, 2$, azt a valószínűségi változót, amely azt adja meg, hogy hány (0 és 1 közötti számmal kifejezhető) órával 8 óra után jelent meg a j -ik ember a helyszínen. Ekkor ξ_1 és ξ_2 független a $[0, 1]$ intervallumban egyenletes eloszlású valószínűségi változók. Minket a $-\frac{1}{2} \leq \xi_1 - \xi_2 \leq \frac{1}{2}$ események valószínűsége érdekel. Az $F(u) = P(\xi_1 - \xi_2 < u)$ eloszlás sűrűségfüggvénye a $g(u) = f_1 * f_2(u)$ konvolúció, ahol $f_1(u) = 1$, ha $0 \leq u \leq 1$, $f_1(u) = 0$, különben, $f_2(u) = 1$, ha $-1 \leq u \leq 0$, $f_2(u) = 0$ különben. Ekkor a minket érdeklő mennyiség az $F\left(\frac{1}{2}\right) - F\left(-\frac{1}{2}\right) = \int_{-1/2}^{1/2} g(u) du$ integrál. Továbbá,

$$g(x) = f_1 * f_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(u) f_2(x-u) du = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) f(x-u) du, \quad -\infty < x < \infty,$$

ahol $f(u) = 1$, ha $\frac{1}{2} \leq u \leq \frac{1}{2}$, $f(u) = 0$, ha $u \geq \frac{1}{2}$.

A korábbi feladatok megoldásából következik, hogy $g(u) = 1 - u$, ha $0 < u < 1$
 $g(u) = 1 + u$, ha $-1 < u < 0$. Innen $F\left(\frac{1}{2}\right) - F\left(-\frac{1}{2}\right) = \int_{-1/2}^{1/2} (1 - |u|) du = \frac{3}{4}$.

- 7.) Egy szabályos dobókockát és egy szabályos érmét feldobunk 3300 alkalommal egymástól függetlenül. (Az érme és kockadobások eredményei is függetlenek egymástól.) Ha a kockadobás eredménye páros és az érme a fej oldalra esett, akkor annyi forintot nyerünk, amennyi a kockadobás eredménye. Ha az érme az írás oldalra esett vagy a kockadobás eredménye páratlan szám, akkor nem nyerünk, és nem is veszünk semmit. Mi a valószínűsége annak, hogy az össznyereményünk 3190 és 3520 forint közé esik? Adjunk erre jó közelítő becslést a centrális határeloszlástétel és egy normális eloszlástáblázat segítségével.

Megoldás: Vezessük be a következő ξ_j , és η_j $1 \leq j \leq 3300$, valószínűségi változókat: $\xi_j = 2$, ha a j -ik kockadobás eredménye 2, $\xi_j = 4$, ha a j -ik kockadobás eredménye 4, $\xi_j = 6$, ha a j -ik kockadobás eredménye 6, $\xi_j = 0$, ha a j -ik kockadobás eredménye 1, 3 vagy 5. Legyen $\eta_j = 1$, ha a j -ik érmédobás eredménye fej, és $\eta_j = 0$, ha a j -ik érmédobás írás. Legyen $\zeta_j = \xi_j \eta_j$. Ekkor a j -ik dobásnál a nyereményünk

ζ_j lesz, $1 \leq j \leq 3300$, és a $P\left(3190 \leq \sum_{j=1}^{3300} \zeta_j \leq 3520\right)$ valószínűséget kell jól megbecsülnünk. Ennek érdekében számoljuk ki a független ζ_j valószínűségi változók várható értékét és szórásnégyzetét. $E\zeta_j = E\xi_j \eta_j = E\xi_j E\eta_j = \frac{1}{6}(2 + 4 + 6) \cdot \frac{1}{2} = 1$,
 $E\zeta_j^2 = E\xi_j^2 E\eta_j^2 = \frac{1}{6}(4 + 16 + 36) \cdot \frac{1}{2} = \frac{14}{3}$, $\text{Var } \zeta_j^2 = E\zeta_j^2 - (E\zeta_j)^2 = \frac{11}{3}$. Innen a centrális határeloszlástétel alapján

$$P\left(3190 \leq \sum_{j=1}^{3300} \zeta_j \leq 3520\right) = P\left(\frac{-110}{\sqrt{3300 \cdot \frac{11}{3}}} \leq \frac{\sum_{j=1}^{3300} \zeta_j - \sum_{j=1}^{3300} E\zeta_j}{\sqrt{\sum_{j=1}^{3300} \text{Var } \zeta_j}} \leq \frac{220}{\sqrt{3300 \cdot \frac{11}{3}}}\right)$$

$$\sim \Phi(2) - \Phi(-1) = 0.9772 + 0.8413 - 1 = 0.9285.$$

- 8.) Egy pénzdarabról ellenőrizni akarjuk, hogy igaz-e az a hipotézis, amely szerint ez az érme legalább $\frac{3}{4}$ valószínűséggel esik a fej és legfeljebb $\frac{1}{4}$ valószínűséggel az írás oldalára. Ennek érdekében feldobjuk a pénzdarabot 30 000 alkalommal, és a következő döntési szabályt hozzuk. Választunk egy k számot, és akkor fogadjuk el a hipotézist helyesnek, ha legalább k fejdobás történt. Legalább mekkorának kell válassztanunk ezt a k számot, ha azt akarjuk, hogy egy a hipotézist teljesítő pénzdarab esetén legalább 0.9 valószínűséggel döntsünk úgy, hogy a hipotézis teljesül?

Megoldás: Vezessük be a következő valószínűségi változókat: $\xi_j = 1$, ha a j -ik dobás eredménye fej, $\xi_j = 0$, ha a j -ik dobás eredménye írás, $1 \leq j \leq 30\,000$,
 $S = S_{30000} = \sum_{j=1}^{30\,000} \xi_j$. Ha a fejdobás eredményének valószínűsége pontosan $\frac{3}{4}$,
 $E\xi_j = \frac{3}{4}$, $E\xi_j^2 = \frac{3}{4}$, $\text{Var } \xi_j = E\xi_j^2 - (E\xi_j)^2 = \frac{3}{16}$, $ES = 30\,000E\xi_j = 22\,500$,
 $\text{Var } S = 30\,000\text{Var } \xi_j = 5625 = 75^2$. Innen és a centrális határeloszlástételből,

$$P(S > k) = P\left(\frac{S - ES}{\sqrt{\text{Var } S}} > \frac{k - 22\,500}{75}\right) = 1 - P\left(\frac{S - ES}{\sqrt{\text{Var } S}} \leq \frac{k - 22\,500}{75}\right) \\ \sim 1 - \Phi\left(\frac{k - 22\,500}{75}\right).$$

Válasszuk a k számot úgy, hogy a fenti valószínűség körülbelül 0.9 legyen. Ekkor a $\Phi\left(\frac{k - 22\,500}{75}\right) = 0.1$ vagy ami ezzel ekvivalens, a $\Phi\left(\frac{22\,500 - k}{75}\right) = 0.9$ egyenletet kell kielégítenünk. A normális eloszlás-táblázat alapján $\frac{22\,500 - k}{75} \sim 1.28$, ami azt jelenti, hogy $k = 22\,500 - 75 \times 1.28$ és $p = \frac{3}{4}$ esetén annak valószínűsége, hogy a fejdobások száma nagyobb mint $k = 22\,500 - 75 \times 1.28 = 22\,212$ és $p = \frac{3}{4}$ esetében annak valószínűsége, hogy legalább ennyi fejdobás történik körülbelül 0.9. Ha $p \geq \frac{3}{4}$, akkor ez a valószínűség nagyobb. Ezért a $k = 22\,212$ helyes választás.

- 9.) Ledobunk egymástól függetlenül 24 000 pontot a $[0, 2]$ intervallumra egyenletes eloszlással, (azaz annak a valószínűsége, hogy egy ledobott pont értéke x -nél kisebb $\frac{x}{2}$ -vel egyenlő, ha $0 \leq x \leq 2$, eggyel egyenlő, ha $x \geq 2$, és nulla, ha $x \leq 0$.) Őrizzük meg azokat a ledobott pontokat, melyek értéke 1-nél kisebb, és hagyjuk el azokat, melyek értéke, nagyobb mint egy. Mi annak a valószínűsége, hogy a megőrzött pontok értékeinek az összege 5900 és 6075 közé esik? Adjunk erre a valószínűségre jó közelítő becslést a mellékelt normális eloszlástáblázat segítségével.

Megoldás: Vezessük be a következő ξ_j , $1 \leq j \leq 24\,000$, valószínűségi változókat: $\xi_j = x$, ha a j -ik ledobott pont értéke x , és $0 \leq x \leq 1$, és $\xi_j = 0$, ha a j -ik ledobott pont értéke az $(1, 2]$ intervallumba esik. Ekkor a megőrzött pontok

összege $S = \sum_{j=1}^{24\,000} \xi_j$, továbbá a ξ_j valószínűségi változók függetlenek és egyforma eloszlásúak. Ezért a centrális határeloszlástétel segítségével jó becslést tudunk adni a minket érdeklő $P(5900 < S < 6075)$ valószínűsége. Ennek érdekében ki kell számolnunk a ξ_1 valószínűségi változó várható értékét és szórásnégyzetét. Vegyük észre, hogy ugyan a ξ_1 valószínűségi változónak nincs sűrűségfüggvénye, és nem diszkrét eloszlású, viszont annak F eloszlásfüggvénye felírható $F(x) = F_1(x) + F_2(x)$ alakban, ahol $F_1(x)$ nek van sűrűségfüggvénye, ami az $f(x) = \frac{1}{2}$ függvény a $[0, 1]$ intervallumon, és $f(x) = 0$, ha $x < 0$ vagy $x > 1$, és $F_2(x)$ olyan mértéket határoz meg, amelyik a nullába van koncentrálna, és a nulla mértéke $\frac{1}{2}$. Pontosabban, tetszőleges A halmaz valószínűsége $P(A) = \int_A F(dx) = \int_A F_1(dx) + \int_A F_2(dx) = \int_A \frac{1}{2} dx + \int_A F_2(dx)$, ahol $\int_A F_2(dx) = \frac{1}{2}$, ha $0 \in A$, és $\int_A F_2(dx) = 0$, ha $0 \notin A$. Ekkor tetszőleges $h(x)$ függvényre $Eh(\xi) = \int h(x)F(dx) = \int h(x)F_1(dx) + \int h(x)F_2(dx) = \int_0^1 \frac{1}{2}h(x) dx + \frac{1}{2}h(0)$. Ezért

$$E\xi_1 = \frac{1}{2} \int_0^1 x dx = \frac{1}{4}, \quad E\xi_1^2 = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{6},$$

$\text{Var } \xi_1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{16} = \frac{5}{48}$, és $ES = 6000$, $\text{Var } S = 2500$. Innen

$$\begin{aligned} P(5900 < S < 6075) &= P\left(-2 < \frac{S - ES}{\sqrt{\text{Var } S}} < 1.5\right) \\ &\sim \Phi(1.5) - \Phi(-2) = \Phi(1.5) + \Phi(2) - 1. \end{aligned}$$